Type d'entretien

Entretien d'enchainement → Les surfaces à nettoyer sont :

- Les dispositifs et matériel fonctionnel
- Les objets relais
- Le sol
- Les murs si projection uniquement

Entretien de fin de programme → les surfaces à entretenir sont :

- Les dispositifs et matériels utilisés *
- Les objets relais**
- Le sol
- Les murs

*Table d'opération, table d'instruments, scialytique, microscopes (plafond), poste d'anesthésie et tous dispositifs d'anesthésie, bras techniques, colonne coelio /vidéo....tout type de générateur, amplificateur de brillance /appareil d'échographie, robot, console chirurgien, garrots pneumatiques, pompe de résection....

**Interrupteurs, poignées-Tiroirs, télécommande de table, clavierordinateur /souris

La chronologie



Principe d'entretien

- Nettoyer du haut vers le bas
- Nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur
- Utiliser la lavette sur ses 4 faces, une face par surface puis la jeter.

Le chariot d'entretien

Équipement à prévoir :

- Sacs poubelles jaunes et noirs
- Lavettes jetables
- Bandeaux de sol jetables
- Solution hydro-alcoolique
- Boites gants UU de différentes tailles
- Poches d'aspiration

Les produits d'entretien

Le détergent : enlève les souillures

Ex: Déterg'anios 1 sachet ou 20ml pour 8L, valable 24h après dilution

Le détergent désinfectant: enlève les souillures et tue la plupart des micro-organismes

Ex: Nosocomia® 1 sachet ou 20ml pour 8L, valable 24h après dilution

Le désinfectant : tue tous les micro- organismes sur les surfaces préalablement nettoyées.

Ex: eau de javel 1 litre pour 4 litres d'eau, valable 24h après dilution

Cas particulier de l'Oxyfloor®: détergent désinfectant aux propriétés sporicides. A utiliser en cas de *Clostridium Difficile* ou après des travaux. 1 sachet pour 8L valable 8h après dilution.

Les techniques d'entretien

Techniques de dépoussiérage:

- Essuyage humide des surfaces avec une lavette jetable
- Balayage humide des sols avec une gaze

Bionettoyage:

Procédé destiné à réduire la contamination biologique des surfaces. Il est obtenu :

- Soit par l'utilisation d'un produit détergentdésinfectant en une seule opération
- Soit par la combinaison en trois temps :
 - Application d'un détergent
 - Rinçage à l'eau claire
 - Application d'un désinfectant ou d'un détergent- désinfectant

Hygiène et entretien au bloc opératoire



La tenue

Une tenue de bloc propre tous les jours : tunique pantalon, calot UU et masque chirurgical

Des chaussures lavables : si baskets → port de sur chaussures)

Des gants à usage unique non stériles : à changer et à éliminer entre chaque local

Un tablier à usage unique : à porter lors des entretien en 3 temps, à jeter à la fin de l'entretien du local.

Des lunettes de protection: à utiliser pour la dilution des produits d'entretien.

L'hygiène des mains

Sur des mains SANS bijou

Friction SHA au début et à la fin des opérations de nettoyage, à chaque fois que nécessaire, **et après le retrait des gants.**



REF 8972

Indications	En enchainement	En fin de programme
Intervention sans ouverture de viscère creux. Pas de notion de traumatisme ou d'infection du patient. canal carpien, dupuytren, doigt, rizarthrose, plaie non septique, mobilisation, luxation sans incisions, ongle incarné, picc-line, VVC, baso, extempo, nævus, lipome, circoncision, chirurgie dentaire, IVT, diabolos, cystoscopie, phimosis	Bionettoyage en une opération au DD des surfaces sans entretien du sol	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Intervention avec ouverture de viscère creux avec contamination minime. Rupture d'asepsie minime. Arthroscopie, PTE, PTG, PTH, ablation de matériel, butée d'épaule, coiffe, exostose, exérèse de kyste, hygroma non infecté, hémarthrose, infiltration, pseudarthrose, ménisque, ostéotomie, DIDT, arthrolyse, PUC, rupture tendon, biopsie ,amputation, hallux valgus, griffe, tenosynovite de quervain, laminoplastie, laminectomie, cervical, dorsal, pontage, radiofréquence, phlébotomie, phlébotomie, FAV, crossectomie, prothèses mammaires, autogreffe de graisse, blépharochalasis, blépharoplastie, abdominoplastie, LCF, mastopexie, abcès, ablation de PAC, appendicectomie sous coelioscopie, anneau gastrique, cholécystectomie sous coelio, bypass, gastrectomie, colectomie, ORL, fibrome, fissure anale, écho endoscopie, GEP, HAL RAR, hernie, GEU, hystérectomie, hématome, hémorroïde, ovariectomie, pancréatectomie, hydrocèle, orchidopexie, chirurgie dentaire, CMF, chalazion, cataracte, entropion, ptérygion, pinguécula, vitrectomie, amygdale, végétations, cadwell luc, thyroïde, septoplastie, voile du palais, otoplastie, ablation de JJ, cystoscopie, double j, RTUP, RTUV, URSS, TOT, vasectomie, PBP	Bio nettoyage en une opération au DD	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Chirurgie contaminée ou sale ou Changement de chirurgie (cas particulier, chirurgie sale à propre) foyer opératoire infecté, reprise septique, plaie traumatique datant de plus de 4h, tissus dévitalisé, nécrosés, viscère perforée, nettoyage articulaire, appendicectomie + péritonite, abcès purulent, cholecystite aigue, colectomie, fécalome, présence de pus, appareil génito urinaire ouvert et infecté, appareil biliaire ouvert avec bile infectée, maladie Verneuil	Bionettoyage en une opération au DD avec entretien zone préopératoire et sol réalisé 2 fois	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Portage de BMR (BLSE, SARM, PARC), Patient contact BHRe, Papillomavirus, Infestation parasitaire: gale, poux	Bionettoyage en une opération au DD	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Portage de BMR (GISA, ABRI), Portage de BHRe (EPC, ERV, ERG), Risque viral avéré (hépatites B ou C, VIH, rotavirus)	Bionettoyage en une opération au DD avec entretien zone périopératoire et sol réalisé 2 fois	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Greffe d'organe	Avant la greffe : Bionettoyage en 3 temps: DD, rinçage, DD Après la greffe: Bionettoyage en une opération au DD	Bio nettoyage en une opération au DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Clostridium difficile	Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + eau de javel 0,5% ou Bio nettoyage en 1 temps avec Oxyfloor®	Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + eau de javel 0,5% Ou Bio nettoyage en 1 temps avec Oxyfloor® des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Maladie de Creutzfeld-Jakob	Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + eau de javel 2 %	Bionettoyage en 3 temps : détergent + rinçage + eau de javel 2 % des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme
Tuberculose active pulmonaire ou suspicion, COVID 19 ATTENTION passer la ventilation de la salle en dépression	Attente 30 mn puis Bionettoyage en 3 temps: DD, rinçage, DD	Attente 30 mn puis Bionettoyage en 3 temps: DD, rinçage, DD des surfaces + sol + murs à hauteur d'homme